

PET-CT COM ANÁLOGO DE SOMATOSTATINA (DOTA)

Duração: é necessário separar pelo menos 4 horas para a realização do exame.

Como o exame é realizado: O radiofármaco DOTATATE-GALIO 68 (análogo de somatostatina) é ingetado na veia do paciente. O radiofármaco é injetado na veia do paciente e o mesmo aguarda 60 minutos para realização das imagens. O paciente é posicionado no equipamento e são realizadas imagens durante 40 minutos.

Preparo: Não é necessário jejum. Deve ser considerado descontinuar a terapia com octreotide "frio" antes da administração do radiofármaco. Suspender 24 horas para octreotide "frio" de curta ação e 4 semanas para octreotide "frio" de longa duração.

Informações Gerais

- Trazer o pedido médico e exames anteriores. (de sangue e de imagem)
- Capacidade máxima do equipamento: 150kg. (peso do paciente)
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados de um adulto.
- Em caso de gravidez (suspeita ou confirmada) ou em caso de amamentação, não realizar o exame.

Orientações para o dia do exame

- Trazer pedido médico original.
- Trazer autorização.
- Trazer carteirinha do convênio.
- Trazer documento com foto e CPF.
- Trazer exames anteriores da mesma região (*laudo e imagens*).
- Menores de idade devem comparecer acompanhados do responsável legal.
- Chegar com 20 minutos de antecedência, para realizar cadastro do exame e preparo no local.
- Tomar sua medicação de uso contínuo normalmente, com pouca água.